

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1^ο

A.

- α. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 62
- β. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 67
- γ. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 68

B1 T_1 : « Συμμετρία ως προς τον άξονα $x'x$ » Η σχηματική παράσταση φαίνεται δίπλα.

με

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = 1 \cdot x + 0 \cdot y \\ y' = 0 \cdot x + (-1) \cdot y \end{cases}$$

άρα $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

δηλαδή $T_1 \rightarrow (3)$

T_2 : « Στροφή κατά γωνία $\frac{\pi}{2}$ »

Ο πίνακας είναι $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ και για $\theta = \frac{\pi}{2}$ γίνεται:


$$\begin{bmatrix} \cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2} \\ \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

δηλαδή $T_2 \rightarrow (2)$

B2 α. Είναι $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ και $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Επομένως είναι:

$$A = A_1 A_2 - A_2 A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} =$$



$$= \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Είναι $|A| = \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -4 \neq 0,$

άρα ο T είναι κανονικός.

β. Για τον T είναι:

$$\begin{cases} x' = 0 \cdot x + (-2)y \\ y' = -2x + 0 \cdot y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = -2y \\ y' = -2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x' & (1) \\ x = -\frac{1}{2}y' & (2) \end{cases}$$

Αν $M(x,y)$ είναι σημείο της (ε) με (ε) : $2x - y + 5 = 0$ (3),
 και $M'(x',y')$ η εικόνα του M μέσω του μετασχηματισμού T τότε:

$$(3) \xrightarrow{(1)} 2\left(-\frac{1}{2}y'\right) - \left(-\frac{1}{2}x'\right) + 5 = 0 \Leftrightarrow -y' + \frac{1}{2}x' + 5 = 0 \Leftrightarrow -2y' + x' + 10 = 0$$

άρα είναι $-2y' + x' + 10 = 0$ η εξίσωση της εικόνας της (ε) ως προς τον μετασχηματισμό T.

ΘΕΜΑ 2ο

A.

α. Είναι:

$$z = \frac{5+i}{2+3i} = \frac{(5+i)(2-3i)}{2^2+3^2} = \frac{10-15i+2i+3}{13} = \frac{13-13i}{13} = 1-i$$

β. Είναι $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ και $\begin{cases} \sigma\eta\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \eta\mu\varphi = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$

άρα $\varphi = -\frac{\pi}{4}$

Επομένως $z = \sqrt{2} \left[\sigma\eta\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\eta\mu\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right].$

γ. Θεωρία σχολικού βιβλίου σελ. 104 $\rightarrow$ B

δ. Επειδή $z = \sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]$ είναι:

$$z^4 = (\sqrt{2})^4 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) \right]^4 = 2^2 \cdot [\cos(-\pi) + i\sin(-\pi)] = -4$$

άρα Δ.

Β. Είναι $\left| \frac{z-1}{z-i} \right| = 1 \Leftrightarrow \frac{|z-1|}{|z-i|} = 1 \Leftrightarrow |z-1| = |z-i| \Leftrightarrow |z-(1+0i)| = |z-(0+i)| \quad (1).$

Επομένως, οι εικόνες των μιγαδικών z είναι σημεία της μεσοκαθέτου του ευθύγραμμου τμήματος με άκρα τα σημεία $A(1,0)$ και $B(0,1)$

Από την (1), για $z = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y-1)^2} \Leftrightarrow (x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y-1)^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = x^2 + y^2 - 2y + 1 \Leftrightarrow y = x$$

δηλαδή η μεσοκάθετος του AB έχει εξίσωση $y = x$

ΘΕΜΑ 3ο

Α. Είναι: $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 5^2 - 8 \cdot 5 + 16 = 1$

και

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = (\alpha^2 + \beta^2) \ln(5 - 5 + e) + 2(\alpha + 1)e^{5-5} =$$

$$= (\alpha^2 + \beta^2) + 2(\alpha + 1) = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha + 2$$

Β. Για να είναι η f συνεχής στο $x_0 = 5$ πρέπει:

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = f(5) \Leftrightarrow 1 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha + 2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha + 1 = 0 \Leftrightarrow (\alpha + 1)^2 + \beta^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -1 \\ \text{και} \\ \beta = 0 \end{cases}$$

Γ. Για $\alpha = -1$ και $\beta = 0$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 8x + 16, & 0 < x < 5 \\ \ln(x - 5 + e), & x \geq 5 \end{cases}$$

και επειδή $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 5 + e) = +\infty$, είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x - 5 + e) = +\infty$

ΘΕΜΑ 4^ο

α. Είναι $f'(t) = \frac{8}{t+1} - 2, t \geq 0$.

Επειδή $\frac{1}{t+1} = \frac{(t+1)'}{t+1}$ με $t+1 > 0$, είναι $f(t) = 8\ln(t+1) - 2t + c$,

$f(0) = 0$ (το φάρμακο χορηγείται πρώτη φορά),

άρα $8\ln(0+1) - 2 \cdot 0 + c \Leftrightarrow c = 0$

και $f(t) = 8\ln(t+1) - 2t, t \geq 0$.

β. Είναι $f'(t) = \frac{8}{t+1} - 2 = \frac{8-2(t+1)}{t+1} = \frac{6-2t}{t+1}$, ομόσημη του $6-2t$

Είναι:

t	0	3
$6-2t$	+	-
$f'(t)$	+	-
$f(t)$		

Για $t = 3$ η συγκέντρωση είναι μέγιστη.

γ. Έχουμε:

• Για $t = 8$ είναι $f(8) = 8\ln 9 - 16 = 8\ln 3^2 - 16 = 16\ln 3 - 16 = 16(\ln 3 - 1)$

Επειδή $3 > e$ είναι $\ln 3 > \ln e = 1$, άρα $f(8) > 0$.

Δηλαδή υπάρχει φάρμακο, άρα και επίδραση στον οργανισμό.

• Για $t = 10$ είναι $f(10) = 8\ln 11 - 20 \approx 8 \cdot 2,4 - 20 = -0,8 < 0$.

Επειδή η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $[8, 10]$, το σύνολο τιμών της f στο $[8, 10]$ είναι $[f(10), f(8)]$. Το $0 \in [f(10), f(8)]$ επομένως, υπάρχει $t_0 \in (8, 10)$ έτσι

ώστε $f(t_0) = 0$ δηλαδή τη χρονική στιγμή t_0 η συγκέντρωση είναι 0, άρα στο

$(t_0, 10)$ η συγκέντρωση είναι αρνητική, δηλαδή δεν υπάρχει φάρμακο, άρα και επίδραση στον οργανισμό.