



# 08 επαναληπτικά θέματα

## Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

### ΑΛΓΕΒΡΑ

#### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>

- A)** Σχολικό Βιβλίο Σελίδα 136.  
**B)** Λάθος, Σωστό, Σωστό, Σωστό, Λάθος.  
**C)** Γ, Β, Δ, Γ, Β, Α

### ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>

- a)**  $P(x) = F(x) \Leftrightarrow x^3 - 5x^2 + 16x - 12 = x^2 + 5x - 6 \Leftrightarrow x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$   
 Πιθανές ακέραιες ρίζες οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ . Έχουμε το παρακάτω σχήμα Horner:

1	-6	11	-6	1
	1	-5	6	
1	-5	6	0	

Άρα η εξίσωση γίνεται:

$$(x-1)(x^2-5x+6)=0 \Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x^2-5x+6=0 \Leftrightarrow x=1 \text{ ή } x=2 \text{ ή } x=3.$$

- b)** Πρέπει και αρκεί  $P(x) < 0 \Leftrightarrow x^3 - 5x^2 + 16x - 12 < 0$   
 Πιθανές ακέραιες ρίζες οι  $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$ .

1	-5	16	-12	1
	1	-4	12	
1	-4	12	0	

Η ανίσωση γίνεται  $(x-1)(x^2-4x+12) < 0 \Leftrightarrow x < 1$ .

Το τριώνυμο  $x^2-4x+12$  είναι θετικό για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , αφού  $\Delta < 0$ .

Τελικά για  $x \in (-\infty, 1)$  η γραφική παράσταση του  $P(x)$  βρίσκεται κάτω από τον  $x$ 'x.

- γ)** Έχουμε  $\alpha_1 = 3$  και  $\lambda = 2$ , άρα  $\alpha_v = \alpha_1 \lambda^{v-1} = 3 \cdot 2^{v-1}$ .

- i)**  $\alpha_v = 192 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{v-1} = 192 \Leftrightarrow 2^{v-1} = 64 \Leftrightarrow 2^{v-1} = 2^6 \Leftrightarrow v-1 = 6 \Leftrightarrow v = 7$ , άρα ο όρος είναι ο έβδομος.

- ii)** Έχουμε:  $\frac{\alpha_{v+1}}{\alpha_v} = \lambda$ , για κάθε  $v \in \mathbb{N}^*$ . Το ζητούμενο γινόμενο ισούται με

$$\lambda \cdot \frac{1}{\lambda} = 1.$$

### ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>

**a)** Για κάθε  $x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $\kappa \in \mathbb{Z}$  είναι:

$$f(x) = \frac{\eta\mu 4x + 2\eta\mu 2x}{\sin vx} = \frac{2\eta\mu 2x \sin vx + 2\eta\mu 2x}{\sin vx} = \frac{2\eta\mu 2x (\sin vx + 1)}{\sin vx} =$$

$$\frac{2 \cdot 2\eta\mu x \sin vx (2\sin vx - 1 + 1)}{\sin vx} = 8\eta\mu x \sin^2 v x = 8\eta\mu x (1 - \eta\mu^2 x^2) = 8\eta\mu x - 8\eta\mu^3 x^3.$$

**b)** Για κάθε  $x \neq \kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ ,  $\kappa \in \mathbb{Z}$  είναι:

$$f(x) = 16\eta\mu x \Leftrightarrow 8\eta\mu x - 8\eta\mu^3 x = 16\eta\mu x \Leftrightarrow 8\eta\mu^3 x + 8\eta\mu x = 0 \Leftrightarrow$$

$$8\eta\mu x(\eta\mu^2 x + 1) = 0 \stackrel{\eta\mu^2 x + 1 \neq 0}{\Leftrightarrow} \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow x = \kappa\pi, \kappa \in \mathbb{Z}$$

**γ)**  $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 8\eta\mu \frac{\pi}{6} - 8\eta\mu^3 \frac{\pi}{6} = 8 \cdot \frac{1}{2} - 8\left(\frac{1}{2}\right)^3 = 4 - 1 = 3$

$f(0) = 8\eta\mu 0 - 8\eta\mu^3 0 = 0$

$f\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 8\eta\mu\left(-\frac{\pi}{6}\right) - 8\eta\mu^3\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 8\left(-\frac{1}{2}\right) - 8\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -4 + 1 = -3.$

Έχουμε:  $2f(0) = f\left(\frac{\pi}{6}\right) + f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ , αρα οι  $f\left(-\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $f(0)$ ,  $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$  είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>

$f(x) = \ln(x + \alpha - \beta), x > -\alpha + \beta.$

**A. a)**  $\ln 6 + f\left(\frac{\pi}{2}\right) - \ln 5 = \ln \pi \Leftrightarrow \ln 6 + \ln\left(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta\right) - \ln 5 = \ln \pi \Leftrightarrow$

$\ln\left(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta\right) = \ln 5 + \ln \pi - \ln 6 \Leftrightarrow \ln\left(\frac{\pi}{2} + \alpha - \beta\right) = \ln \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + \alpha - \beta = \frac{5\pi}{6} \Leftrightarrow$

$\alpha - \beta = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \alpha - \beta = \frac{\pi}{3}.$

**β)**  $f(x) = \ln(x + \frac{\pi}{3})$ ,  $x > -\frac{\pi}{3}$

$\eta\mu(e^{f(x)}) \sigma v v(e^{f(x)}) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2\eta\mu(e^{f(x)}) \sigma v v(e^{f(x)}) = 1 \Leftrightarrow$

$\eta\mu(2e^{f(x)}) = 1$

$\Leftrightarrow \eta\mu(2e^{\ln(x + \frac{\pi}{3})}) = 1 \Leftrightarrow \eta\mu(2(x + \frac{\pi}{3})) = 1 \Leftrightarrow \eta\mu(2x + \frac{2\pi}{3}) = \eta\mu \frac{\pi}{2}$

$\Leftrightarrow 2x + \frac{2\pi}{3} = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \kappa\pi - \frac{\pi}{12}, \kappa \in \mathbb{Z}.$

$$\text{Πρέπει: } x > -\frac{\pi}{3} \Leftrightarrow \kappa\pi - \frac{\pi}{12} > -\frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \kappa > -\frac{1}{4}, \kappa \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \kappa = 0, 1, 2, \dots$$

$$\text{Τελικά } x = \kappa\pi - \frac{\pi}{12}, \kappa \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

(Η μη χρησιμοποίηση του τελευταίου περιορισμού, προτείνεται να μη θεωρηθεί λάθος.)

**B. α)**  $f(1) = 0 \Leftrightarrow \ln(1 + \alpha - \beta) = 0 \Leftrightarrow 1 + \alpha - \beta = 1 \Leftrightarrow \alpha - \beta = 0.$

**β)**  $f(x) = \ln x, x > 0$

Η ανίσωση ορίζεται όταν  $x > 0$ .

$$\begin{aligned} 16 \cdot 2^{f(x)} < 2^{\ln(2e^4)} &\Leftrightarrow 2^4 \cdot 2^{f(x)} < 2^{\ln(2e^4)} \Leftrightarrow 2^{f(x)+4} < 2^{\ln(2e^4)} \\ &\Leftrightarrow f(x) + 4 < \ln 2 + \ln e^4 \Leftrightarrow f(x) < \ln 2 \Leftrightarrow \ln x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 2. \end{aligned}$$

**ΕΠΟΥΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΝΑΜΑΤΑ**