ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015
Β ΦΑΣΗ

Ε_3.ΒΦλ3ΘΤ(α)

ΤΑΞΗ: **3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ)**

ΜΑΘΗΜΑ: **ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ**

Ημερομηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1. γ

Α2. δ

Α3. γ

Α4. δ

Α5. **α.** Λ

β. Λ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Σ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σωστή απάντηση η γ.

Από το σχήμα 1 προκύπτει η εξίσωση φάσης $\varphi_1=\frac{2\pi}{T}t_1-\frac{2\pi}{\lambda}x$.

Για x=0 είναι $\varphi_1=10\pi$ rad, επομένως $10\pi=\frac{2\pi}{T}\Rightarrow T=0,2s$.

Για x=20cm είναι $\varphi_1=0$, επομένως $0=\frac{2\pi}{0,2}-\frac{2\pi}{\lambda}20\Rightarrow\lambda=4cm$.

Άρα $\upsilon_1=\frac{\lambda}{T}\Rightarrow\upsilon_1=\frac{4cm}{0,2s}\Rightarrow\upsilon_1=20cm/s$.

Διαφορετικά: $\upsilon_1=\frac{x}{t_1}=\frac{20cm}{1s}=20cm/s$.

Από το σχήμα 2 προκύπτει ότι $\upsilon_2 = \frac{x}{t} \Rightarrow \upsilon_2 = \frac{8cm}{24s} \Rightarrow \upsilon_2 = \frac{1}{3} cm/s$.

Επομένως $\frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = \frac{20cm/s}{\frac{1}{3}cm/s} \Rightarrow \frac{\upsilon_1}{\upsilon_2} = 60$.

Β2. Σωστή απάντηση η **α.**

Έστω t_0 ο χρόνος που διαδίδεται η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε απόσταση ℓ στο κενό και t ο χρόνος που χρειάζεται η ίδια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία για να διέλθει από το πλακίδιο πάχους ℓ.

Ισχύει $t_0 = \frac{\ell}{c}$ και $t = \frac{\ell}{\upsilon}$. Τότε

$$\Delta t = t - t_0 = \frac{\ell}{\upsilon} - \frac{\ell}{c} = \ell\left(\frac{1}{\frac{c}{n}} - \frac{1}{c}\right) = \frac{\ell}{c}(n-1)$$

$$\Rightarrow n - 1 = \frac{c}{\ell}\Delta t$$

$$\Rightarrow n = \frac{c}{\ell}\Delta t + 1$$

$$\Rightarrow n = \frac{\Delta t \cdot c + \ell}{\ell}$$

Β3. Σωστή απάντηση η **α.**

Εφαρμόζοντας την Αρχή Διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας μεταξύ της απομάκρυνσης x του ελατηρίου και της θέσης του φυσικού μήκους του, προκύπτει ότι:

$$\frac{1}{2}Kx^2 = \frac{1}{2}M\upsilon_{cm}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \Rightarrow Kx^2 = M\upsilon_{cm}^2 + \frac{1}{2}MR^2\omega^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Kx^2 = M\upsilon_{cm}^2 + \frac{1}{2}M\upsilon_{cm}^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Kx^2 = \frac{3}{2}M\upsilon_{cm}^2 \Rightarrow \upsilon_{cm} = x\sqrt{\frac{2K}{3M}}$$

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο είναι:

$$x = A\eta\mu(\omega t + \theta)$$

Όπου $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\sigma\upsilon\nu\varphi}$ με

$$\sigma\upsilon\nu\varphi = \sigma\upsilon\nu\frac{5\pi}{6} = \sigma\upsilon\nu\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Άρα $A = \sqrt{\left(10\sqrt{3}\right)^2 + 10^2 + 2\cdot 10\sqrt{3}\cdot 10\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = 10\text{cm}$

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{A_2\eta\mu\varphi}{A_1 + A_2\sigma\upsilon\nu\varphi} = \frac{10\cdot\frac{1}{2}}{10\sqrt{3} + 10\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

άρα $\theta = \frac{\pi}{6}\text{rad}$.

Επομένως $x = 10\eta\mu\left(10\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ (x σε cm και t σε sec)

Γ2. Τη χρονική στιγμή $t_1 = \frac{1}{60}\text{sec}$ το σώμα βρίσκεται στη θέση

$$x = 10\eta\mu\left(10\pi t_1 + \frac{\pi}{6}\right) \Rightarrow x = 10\eta\mu\left(10\pi\frac{1}{60} + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$\Rightarrow x = 10\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = 5\sqrt{3}\text{cm}$$

Άρα ο ζητούμενος λόγος θα είναι

$$\frac{K}{U} = \frac{E-U}{U} = \frac{\frac{1}{2}\cdot D\cdot A^2 - \frac{1}{2}\cdot D\cdot x^2}{\frac{1}{2}\cdot D\cdot x^2} = \frac{10^2 - \left(5\sqrt{3}\right)^2}{75} = \frac{25}{75} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{K}{U} = \frac{1}{3}$$

ΕΠΙΛΟΓΜΑΤΑ

Γ3.



Εφαρμόζουμε Α.Δ.Ο. στον x′x άξονα:

$$\vec{p}_{ολ,x'x(πριν)} = \vec{p}_{ολ,x'x(μετά)} \Rightarrow m\cdot υσυνφ = (M+m)\cdot υ_σ$$
$$\Rightarrow 8 = 4υ_σ \Rightarrow υ_σ = 2m/s$$

Θα υπολογίσουμε τη μεταβολή της ενέργειας της ταλάντωσης $\Delta E_{ταλ.}$.
Όπου η $D = M\cdot\omega^2$ είναι σταθερή πριν και μετά την κρούση.
Η θέση της κρούσης είναι μια τυχαία θέση της νέας ταλάντωσης, στην οποία η δυναμική ενέργεια ισούται με την ενέργεια της αρχικής ταλάντωσης.

$$\left.\begin{matrix} K+U=E' \\ U=E \end{matrix}\right\} \Rightarrow K+E=E' \Leftrightarrow E'-E=K=\frac{1}{2}(m+M)υ_σ{}^2 = 8J$$

Γ4.



ΕΠΙΣΗΜΑ

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_{τελ} - \vec{p}_{αρχ} \Rightarrow \Delta\vec{p} = \vec{p}_{τελ} + (-\vec{p}_{αρχ})$$

$$\Rightarrow |\Delta\vec{p}| = \sqrt{(mυ_σ)^2 + (mυ)^2 + 2mυ_σ \cdot mυ \cdot συν(\pi - \varphi)} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\Delta\vec{p}| = \sqrt{4 + 100 - 32} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |\Delta\vec{p}| = \sqrt{72} \Rightarrow |\Delta\vec{p}| = 6\sqrt{2}\,kg \cdot \frac{m}{s}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Αφού το σύστημα ισορροπεί θα ισχύει:

$$\sum \vec{\tau}_{εξ} = 0 \Rightarrow w_1 R_1 - w_2 R_3 = 0 \Rightarrow m_1 g R_1 - m_2 g R_3 = 0$$

$$\Rightarrow m_2 = \frac{m_1 R_1}{R_3} \Rightarrow m_2 = \frac{2Kg \cdot 0,2m - 1Kg \cdot 0,1m}{0,1m}$$

$$\Rightarrow m_2 = 4Kg$$

Δ2. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα σώματα φαίνονται στο επόμενο σχήμα:



ΕΠΙΣΗΜΑ ΘΕΜΑΤΑ

i. Για τα σημεία Π και Λ των δύο τροχαλιών ισχύει κάθε στιγμή $\alpha_{\Lambda} = \alpha_{\Pi} \Leftrightarrow \alpha_{\gamma(T)} \cdot R_2 = \alpha_{\gamma(\Delta)} \cdot R_3$, δηλαδή $\alpha_{\gamma(T)} = \alpha_{\gamma(\Delta)} = \alpha_{\gamma}$, επομένως οι γωνιακές επιταχύνσεις της διπλής τροχαλία και του δίσκου είναι ίσες.

Για το σύστημα των σωμάτων εφαρμόζουμε το θεμελιώδη νόμο της στροφικής με την μορφή:

$$\sum \vec{\tau}_{\epsilon\xi} = I_{o\lambda} \cdot \vec{\alpha}_{\gamma} \Rightarrow$$

$$(w_2 + w_3)R_3 - w_1R_1 = \left[(m_2 + m_3)R_3^2 + \frac{1}{2}MR_3^2 + I_T + m_1R_1^2\right] \cdot \alpha_{\gamma} \quad (1)$$

Από την σχέση (1) με αντικατάσταση προκύπτει ότι $\alpha_{\gamma} = 10\frac{rad}{s^2}$. Η επιτάχυνση με την οποία κατέρχεται το σύστημα (m_2, m_3) είναι ίδια με την επιτάχυνση του σημείου Ν. Δηλαδή:

$$\alpha_N = \alpha_{\gamma} R_3 = \alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = 1\frac{m}{s^2},$$

όπου α_2 η επιτάχυνση των μαζών m_2, m_3.

ii. Για το σύστημα (m_2, m_3) ισχύει: $h_2 = \frac{1}{2}\alpha_2 t_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{2h_2}{\alpha_2}} \Rightarrow t_1 = 2s$

$$\frac{dK_{(T)}}{dt} = P_T = \sum \tau \cdot \omega = I_T \cdot \alpha_{\gamma} \cdot \alpha_{\gamma} \cdot t\,.$$

Με αντικατάσταση των τιμών τη στιγμή $t=t_1=2s$ προκύπτει:

$$\frac{dK_{(T)}}{dt} = 28\frac{J}{s}$$

Δ3.

$$K_{o\lambda} = K_T + K_{\Delta\text{ίσκου}} + K_{m_1} + K_{m_2+m_3} \Rightarrow$$

$$K_{o\lambda} = \frac{1}{2}I_T\omega^2 + \frac{1}{2}I_3\omega^2 + \frac{1}{2}m_1\upsilon_1^2 + \frac{1}{2}(m_2 + m_3)\upsilon_3^2 \Rightarrow$$

$$K_{o\lambda} = \frac{1}{2}I_T(\alpha_{\gamma} \cdot t)^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}MR_3^2(\alpha_{\gamma} \cdot t)^2 + \frac{1}{2}m_1(\alpha_1 \cdot t)^2 + \frac{1}{2}(m_2 + m_3)(\alpha_2 \cdot t)^2$$

όπου $\alpha_1 = \alpha_{\gamma} \cdot R_1 = 2m/s^2$ η επιτάχυνση της μάζας m_1.

Με αντικατάσταση των τιμών τη στιγμή $t=t_1=2s$, προκύπτει $K_{o\lambda} = 60J$.

Δ4. Ο ανιχνευτής ήχου στο σημείο Α λαμβάνει δύο ήχους. Έναν από την πηγή στο σημείο Γ συχνότητας $f_{\Gamma\to A}$ και έναν από την πηγή της μάζας m_3, συχνότητας $f_{X\to A}$. Επειδή η ταχύτητα της μάζας m_3 καθώς

κατέρχεται δεν βρίσκεται πάνω στην διεύθυνση πηγής – ανιχνευτή μας ενδιαφέρει η συνιστώσα $\upsilon_{3,x}$ της ταχύτητας. (Βλέπε σχήμα)



$$\upsilon_{3,x} = \upsilon_3 \sigma\upsilon\nu\varphi \Rightarrow \upsilon_{3,x} = \alpha_2 \cdot t \cdot \frac{(X\Delta)}{(X\Lambda)} \Rightarrow \upsilon_{3,x} = \alpha_2 \cdot t \cdot \frac{(X\Delta)}{\sqrt{(X\Delta)^2 + (\Lambda\Delta)^2}} \quad (3)$$

Όμως $(X\Delta) = h_1 - h_2 = 6m$.

Με αντικατάσταση στην (3) προκύπτει: $\upsilon_{3,x} = 1,2\frac{m}{s}$.

Έτσι:

$$f_{X\to A} = \frac{\upsilon_{\eta\chi}}{\upsilon_{\eta\chi} - \upsilon_{3,x}} f_2 \Rightarrow f_{X\to A} = \frac{(340m/s)}{(340m/s - 1,2m/s)} f_2$$

$$\Rightarrow f_{X\to A} = \frac{340}{338,8} f_2 \,(SI) \qquad (4)$$

$f_{\Gamma\to A} = f_1 = 3434Hz$ διότι η πηγή στο Γ και ο ανιχνευτής στο Α είναι ακίνητοι.

Σύμφωνα με την αρχή της επαλληλίας $x = x_1 + x_2$, όπου:

$$x_1 = A\eta\mu\omega_1 t \text{ και } x_2 = A\eta\mu\omega_2 t$$

Οπότε τελικά προκύπτει:

$$x = 2A\sigma\upsilon\nu\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t \cdot \eta\mu\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t$$

Άρα η συχνότητα του ήχου που ακούει εκείνη την στιγμή (t_1) είναι ίση με:

$$f_A = \frac{f_{X\to A} + f_{\Gamma\to A}}{2} \Rightarrow f_{X\to A} = 3400Hz$$

Με αντικατάσταση στη (4) προκύπτει ότι $f_2 = 3388Hz$.

Τα ερωτήματα **Δ1** και **Δ2** μπορεί επίσης να λυθούν:

- **Δ1:** Εφαρμόζοντας τη συνθήκη ισορροπίας σε κάθε σώμα χωριστά.
- **Δ2:** Εφαρμόζοντας τους νόμους της κίνησης σε κάθε σώμα χωριστά.

Οι απαντήσεις είναι ενδεικτικές. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.