

**ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β')
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ**

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α

A1. → α, A2. → γ, A3. → δ, A4. → β, A5. → γ

ΘΕΜΑ Β

B1. Σελίδα 120 σχολικού. «Για την επιλογή οργάνων ... είναι επιτυχείς.»

B2. Σελίδα. 136 σχολικού. «Το 1997 ... γέννησε τη Dolly.»

B3. Τα κύρια ένζυμα που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA ονομάζονται DNA πολυμεράσες και σελίδα 30 σχολικού. «Οι DNA πολυμεράσες ... προσανατολισμό 5' → 3'.»

B4. Σελίδα 108 σχολικού. «Όπως και όλοι οι υπόλοιποι ... διαφόρων μορίων.»

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Σελίδα 108 σχολικού. «Η παρουσία ή απουσία O₂ ... (υποχρεωτικά αναερόβιοι).»

Στο διάγραμμα του μικροοργανισμού Α, φαίνεται αύξηση του αριθμού των μικροοργανισμών στο διάστημα 0 – t₁ και συνεχίζεται η αύξηση του πληθυσμού τους και κατά το διάστημα t₁ – t₂. Άρα ο μικροοργανισμός αναπτύσσεται και παρουσία και απουσία O₂.

Συνεπώς είναι προαιρετικά αερόβιος.

Στο διάγραμμα του μικροοργανισμού Β, φαίνεται αύξηση του αριθμού των μικροοργανισμών στο διάστημα 0 – t₁ και μείωση κατά το διάστημα t₁ – t₂. Άρα ο μικροοργανισμός είναι υποχρεωτικά αερόβιος.

Στο διάγραμμα του μικροοργανισμού Γ, παρατηρείται μείωση του πληθυσμού τους μέχρι του μηδενισμού τους. Άρα το O₂ είναι τοξικό γι αυτό το είδος των μικροοργανισμών, άρα είναι υποχρεωτικά αναερόβιος.

Γ2. Η μεταβολή της συγκέντρωσης του O₂ στο βιοαντιδραστήρα όπου καλλιεργείται ο μικροοργανισμός Α γίνεται κατά την εκθετική φάση. Αυτό συμβαίνει διότι κατά τη λανθάνουσα φάση ο πληθυσμός των μικροοργανισμών διατηρείται σταθερός λόγω προσαρμογής του στο περιβάλλον, ενώ κατά την εκθετική φάση παρατηρείται μέγιστος ρυθμός ανάπτυξης αρχικά παρουσία O₂ και στη συνέχεια ανάπτυξη των μικροοργανισμών με μικρότερο ρυθμό σε μικρές συγκεντρώσεις O₂.

Γ3. Σελίδα 110 σχολικού. «Στη συνέχεια, ... αυξάνεται εκθετικά.»

Γ4. Σελίδα 109 σχολικού. «Με τον όρο ζύμωση ... αντιβιοτικά.»

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Το τμήμα του δίκλωνου DNA που κωδικοποιεί το πεπτίδιο είναι:

Κωδική: 5' ATGAATTCTGCTATGTGA3'

Μη κωδική: 3' TACTTAAGACGATACACT5'

Το αμινικό άκρο κάθε πεπτιδικής αλυσίδας οριοθετεί την αρχή της.

Σύμφωνα με το γενετικό κώδικα, κάθε κωδικόνιο του mRNA κωδικοποιεί ένα αμινοξύ.

Έτσι λοιπόν το mRNA, από το οποίο κωδικοποιείται το πεπτίδιο είναι:

mRNA: 5' AUGAAUUCUGCUAUGUGA3'

Σελίδες 32 - 33 σχολικού βιβλίου. «Κατά την έναρξη ... ενός γονιδίου.»

Δ2. Σελίδα 57 σχολικού. «Μια από περιοριστικές ενδονουκλεάσες ... στο κομμένα άκρα»

Σύμφωνα με τα προηγούμενα στο παραπάνω μόριο DNA υπάρχει μια φορά η αλληλουχία

5' GAATTC3'

3' CTTAAG5'

που κόβεται από τη EcoRI.

Δ3. Σελίδες 36 – 37 σχολικού. «Έναρξη: ... της πρωτεϊνοσύνθεσης.»

Σελίδες 37 – 38 σχολικού. «Σημειώνεται ... ονομάζεται πολύσωμα.»